



# Reumatología Clínica

<http://www.reumatologi clinica.org>



## P223 - ESTADO, CONTROL, IMPACTO Y GESTIÓN DE SÍNTOMAS ACTUAL DE LA ARTRITIS REUMATOIDE EN EL PACIENTE: ENCUESTA NACIONAL AR 2020

F. Sivera Mascaró<sup>1</sup>, L. Alcaide<sup>2</sup>, A.I. Torralba<sup>3</sup>, J. Eusamio Serre<sup>3</sup>, C. García Cotarelo<sup>3</sup> y E. Loza<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Hospital General de Elda. <sup>2</sup>Coordinadora Nacional de Artritis. Madrid. <sup>3</sup>Ekineo Business Intelligence. Barcelona.

<sup>4</sup>Instituto de Salud Musculoesquelética. Madrid.

### Resumen

**Objetivos:** Analizar el estado, control e impacto actual de la artritis reumatoide (AR) en la vida del paciente así como la gestión de los síntomas de la AR.

**Métodos:** Proyecto promovido por la Coordinadora Nacional de Artritis, asociación de pacientes ConArtritis. Se diseñó una encuesta estructurada (18 minutos de duración), en formato electrónico para ser contestada por pacientes con AR, mayores de 18 años residentes en España. Se abrió el 7 de octubre y se cerró el 9 de diciembre. Como fuentes de captación se emplearon las siguientes: 1) Miembros asociados a ConArtritis o sus asociaciones con invitación a través del correo electrónico o publicación en las redes sociales; 2) Pacientes participantes en la plataforma [www.in-pacient.es](http://www.in-pacient.es) mediante invitación directa dentro de la plataforma; 3) Vínculos desde la página web de ConArtritis y redes sociales abiertas. Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas (edad, sexo, duración AR), la pertenencia o no a una asociación de pacientes y variables relacionadas con los objetivos propuestos, que incluye el RAPID3 salvo las preguntas sobre abrir grifos, caminar 3 kilómetros y la participación de juegos y deportes que son sustituidas por subir y bajar escaleras, hacer las tareas propias del trabajo y conducir. Se realizó un análisis descriptivo.

**Resultados:** Analizamos 882 pacientes, 89% mujeres, edad mediana de 52 años, 31,9% AR de menos de 5 años de evolución, y un 75,6% no pertenece a una asociación de pacientes. El dolor y la valoración global de la enfermedad actuales medios (escala 0-10) fueron de 5,1 y 4,9 respectivamente. En cuanto a la función (tabla), el porcentaje de pacientes con muchas dificultades o imposibilidad para realizar tareas cotidianas varió del 6,4% al 49,2%. En base al RAPID3, el 8,3% de los pacientes estaban en remisión, el 6,5% con baja actividad, el 28,5% con moderada actividad y el 56,8% con alta actividad. Y, según la percepción de los pacientes, el control de la AR, para el 12,5% está totalmente controlada, para el 43,5% bien controlada, el 29,6% considera que algo controlada, y el 14,4% nada o poco controlada. Los pacientes refieren mucho impacto o impacto grave del 31,5% a nivel emocional, 12,4% a nivel cognitivo, 29,2% en el ámbito laboral o académico, 18,7% a nivel social, y del 15,1% a nivel familiar. Además, el 42,2% refiere que necesita de la ayuda de una persona para realizar las actividades del día a día. Un 56% de los encuestados en una escala de 0 (nada preocupado)-10 (extremadamente preocupado) refiere estar con un nivel de preocupación por su futuro > de 8, la media alcanza 7,4 puntos. Para el 41,9% de los pacientes el dolor es el síntoma que más impacta en su vida seguido de la fatiga e inflamación. En el último mes, el 74,4% describe la presencia de inflamación articular, y el impacto en este tiempo de síntomas como el

dolor, fatiga, inflamación y rigidez matutina varía de 5,1 a 5,7 en una escala de 0 (nada)-10 (el mayor impacto). Finalmente, en cuanto a la gestión de estos síntomas en una escala de 0 (muy bien gestionado)-10 (muy mal o nada gestionado), se obtuvo una puntuación media de 4,3 a 5,3. Las estrategias de control de síntomas más utilizadas son los tratamientos farmacológicos, dejar de realizar algunas actividades y el reposo.

Pacientes que refieren mucha dificultad o imposibilidad a la hora de realizar las siguientes tareas

| Pregunta                                       | Porcentaje (%) |
|--|----------------|
| Vestirse solo/a                                | 12,7%          |
| Entrar y salir de la cama                      | 9,29%          |
| Levantar una taza o un vaso llenos             | 6,4%           |
| Caminar fuera casa en plano                    | 10,8%          |
| Lavarse y secarse el cuerpo                    | 10,2%          |
| Agacharse y levantar ropa del suelo            | 20,7%          |
| Subir y bajar escaleras                        | 24,2%          |
| Entrar y salir de un coche                     | 13,5%          |
| Hacer tareas de tu trabajo                     | 27,8%          |
| Coger o levantar peso                          | 49,2%          |
| Solo en caso de disponer de carnet, ¿Conducir? | 10,5%          |

**Conclusiones:** Actualmente un porcentaje elevado de pacientes presenta una AR con distintos grados de actividad. El impacto actual de la AR en la vida del paciente sigue siendo muy alto.